

:: Ανωμαλία Rieger

Αριθμός Orphanet: ORPHA91483

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανωμαλία Rieger είναι μια συγγενής οφθαλμική διαταραχή που προκαλείται από δυσγενεσία του πρόσθιου τμήματος και χαρακτηρίζεται από σοβαρή παραμόρφωση του πρόσθιου θαλάμου με εμφανή σκέλη και σημαντική ατροφία του στρώματος της ίριδος, με οπή ή το σχηματισμό ψευδο-οπής και κορεκτοπία. Ο όρος συσχετίζει τις συγκεκριμένες ανωμαλιών της ίριδος και της κόρης με τα χαρακτηριστικά της ανωμαλίας Axenfeldís (βλ. τον όρο αυτό).

Ειδικός εμπειρογνώμων:

Μετάφραση – Επιμέλεια:

- Κοσμά Κωνσταντίνα, MD. Κλινική Γενετίστρια
- Ελένη Μιχελακάκη, PhD. Εθνική Συντονίστρια του Ελληνικού Orphanet

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2012

Μετάφραση: Φεβρουάριος 2014



Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία.

