

## :: Łysienie czołowe włókniejące

Orpha number: ORPHA254492

### STRESZCZENIE

#### **\*Definicja choroby:**

Łysienie czołowe włókniejące (ang. *frontal fibrosing alopecia*; FFA) jest rzadką odmianą łyszenia płaskiego mieszkowego (zob. to hasło); charakteryzuje się symetryczną, postępującą i taśmowatą utratą włosów w części przedniej głowy.

#### **\*Epidemiologia:**

Częstość występowania jest nieznana. Choroba najczęściej dotyczy kobiet w okresie postmenopauzalnym, ale opisywana była także u mężczyzn i u kobiet przed menopauzą.

#### **\*Opis kliniczny:**

Obserwuje się postępujące cofanie się linii owłosienia w okolicy czołowej i skroniowej. W około połowie wszystkich przypadków FFA dochodzi również do utraty brwi, rzadziej do utraty włosów w innych częściach ciała. Bardzo rzadko FFA współistnieje z klasycznymi zmianami łyszenia płaskiego o innych lokalizacjach. W badaniu histopatologicznym, na brzegach dotkniętych okolic stwierdza się okołomieszkowe nacieki limfocytarne i nadmierne rogowacenie mieszkowe, natomiast pozostała część zmiany jest blada, z zanikiem ujścia mieszka. Histologicznie jest nieodróżniona od innych postaci łyszenia mieszkowego.

#### **\*Etiologia:**

Sugeruje się, że choroba może mieć podłoże hormonalne, ale do tej pory dokładna etiologia pozostaje nieznana.

Recenzent - ekspert:

- Dr Dr Stephanie Arnold
- Dr Susan Cooper

Aktualizacja: Maj 2011

Tłumaczenie: Wrzesień 2013

*Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”*





---

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

---

