

## :: Szzelina tchawiczo-przełykowa typu 1

Orpha number: ORPHA93938

### STRESZCZENIE

Szczelina tchawiczo-przełykowa (LC) typu 1 to wrodzona wada układu oddechowego charakteryzująca się rozszczepem powyżej głośni wraz z ubytkiem mięśni przestrzeni międzynałekowych powyżej fałdów głosowych z umiarkowanymi objawami ze strony układu oddechowego. Chorobowość tej formy jest trudna do ustalenia ze względu na umiarkowaną naturę choroby, ale uważa się, że jest to schorzenie rzadkie. Objawy kliniczne obejmują świst krtaniowy (stridor), bezbarwny lub ochryply płacz, trudności w połykaniu, takie jak zachłystywanie się, kaszel, duszność, sinica podczas karmienia oraz refluks żołądkowo-przełykowy. Przyczyny powstania tej anomalii nie są znane. U dzieci z łagodnymi objawami leczenie obejmuje utrzymanie odpowiedniej wentylacji, karmienie gęstym pokarmem, terapię refluksu żołądkowo-przełykowego, trzymanie w pozycji pionowej po posiłku oraz właściwa pozycja podczas karmienia, tak aby uniknąć zachłyśnięcia. Dzieci z umiarkowanymi objawami mogą wymagać karmienia przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Jeżeli działania zachowawcze nie dają rezultatu, zaleca się wykonanie korekcji chirurgicznej z dojścia endoskopowego.

**Recenzent-ekspert:** dr N. Leboulanger i dr E.N. Garabedian

**Data:** Listopad 2011

**Tłumaczenie:** Styczeń 2012

*Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”*



---

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

---

