

:: Szzelina tchawiczo-przełykowa typu 2

Orpha number: ORPHA93939

STRESZCZENIE

Szczelina tchawiczo-przełykowa (LC) typu 2 to wrodzona wada układu oddechowego charakteryzująca się rozszczepem rozciągającym się poniżej fałdów głosowych do chrząstki pierścieniowatej, przebiegająca z trudnościami w przełykaniu oraz zapaleniami płuc. Nie ma danych dotyczących chorobowości tej formy LC; uważa się, że jest to rzadkie schorzenie. Pacjenci cierpią z powodu zachłystywania się oraz ciężkich zaburzeń oddychania i połykania. Może występować duszność i świst krtańowy. Przyczyny rozwoju tej anomalii nie są znane. Leczenie polega na stosowaniu terapii antyrefluksowej oraz żywieniu przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Leczenie obejmuje chirurgiczną korekcję rozszczepu z dojścia endoskopowego.

Recenzent-ekspert: dr N. Leboulanger i dr E.N. Garabedian

Data: Listopad 2011

Tłumaczenie: Styczeń 2012

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”



Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.
