

## :: Szzelina tchawiczo-przełykowa typu 3

Orpha number: ORPHA93940

### STRESZCZENIE

Szczelina tchawiczo-przełykowa (LC) typu 3 to wrodzona wada układu oddechowego cechująca się rozszczepem rozciągającym się przez chrząstkę pierścieniową, czasami do szyjnej części tchawicy, poważnymi trudnościami w połykaniu, zapaleniami płuc oraz ich uszkodzeniem. Chorobowość tej formy LC nie jest znana, ale uważa się, że jest to bardzo rzadkie schorzenie. Do dnia dzisiejszego w literaturze odnotowano około 30 przypadków. Pacjenci cierpią z powodu ciągłego zachłystywania się oraz ciężkich zaburzeń oddychania i połykania z wysokim ryzykiem zapalenia płuc. Przyczyny powstania tej anomalii nie są znane. U pacjentów z dużych rozmiarów szczeliną tchawiczo-przełykową może być potrzebne okresowe żywienie pozajelitowe z powodu wysokiego ryzyka zachłyśnięcia się. Dużego stopnia LC często wymagają krótko- do długoterminowej gastrotomii, nierzadko z fundoplikacją. Leczenie polega na chirurgicznej korekcji rozszczepu, często wymagające dojścia z zewnątrz. Rokowanie w przypadku tego typu LC jest złe.

**Recenzent-ekspert:** dr N. Leboulanger i dr E.N. Garabedian

**Data:** Listopad 2011

**Tłumaczenie:** Styczeń 2012

*Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”*



---

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

---

