

:: Choroba Mikulicza

Orpha number: 79078

Choroba Mikulicza jest zależnym od IgG4 zaburzeniem charakteryzującym się trwałym, zwykle bezbolesnym, obustronnym powiększeniem gruczołów łzowych, ślinowych przyusznych i podżuchwowych związanym z podwyższonym poziomem immunoglobuliny (Ig) G4 w surowicy oraz naciekami z limfocytów i IgG4-dodatnich plazmacytów. Powoduje to głównie suchość w jamie ustnej i oczach, ale może również wpływać na inne narządy, takie jak płuca, wątroba i nerki oraz powodować towarzyszące powikłania, takie jak autoimmunologiczne zapalenie trzustki (AIP), zwłóknienie zaotrzewnowej i zapalenie kłębuszków nerkowych (zobacz te terminy).

Aktualizacja: styczeń 2013

Tłumaczenie: październik 2015

This publication is part of the project / joint action '677024 / RD-ACTION' which has received funding from the European Union's Health Programme (2014-2020).



Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.
