

:: Dysplazja wielonasadowa typu 5

Orpha number: **93311**

Definicja choroby:

Dysplazja wielonasadowa typu 5 to wielonasadowa dysplazja, charakteryzująca się wczesnym pojawieniem się bólu i sztywności stawów (z udziałem kolan i bioder), postępującą deformacją kończyn i przedwczesną chorobą zwyrodnieniową stawów, związaną z opóźnionym i nieregularnym kostnieniem nasad kości. Cechy charakterystyczne dla dysplazji wielonasadowej typu 5 obejmują prawidłowy wzrost i rzadsze występowanie zaburzeń chodu. Na zdjęciu rentgenowskim widać nieprawidłowości w obrębie nasad i przynasad kości. Dysplazja wielonasadowa typu 5 dziedziczona jest w sposób autosomalny dominujący.

Data: październik 2015

Tłumaczenie: wrzesień 2017

This publication is part of the project / joint action '677024 / RD-ACTION' which has received funding from the European Union's Health Programme (2014-2020).



Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

