

:: Kokcydioidomikoza

Orpha number: 228123

Kokcydioidomikoza jest zakażeniem grzybiczym spowodowanym przez *Coccidioides immitis* i *C. posadasii*, które występują endemicznie w południowo-zachodnich rejonach Stanów Zjednoczonych, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej i w Meksyku. Do zakażenia dochodzi przez wdychanie zakaźnych artrokonidii, często znajdujących się w glebie. Najczęściej przebieg zakażenia jest łagodny, pod postacią przejściowej gorączki, ale w niektórych przypadkach może dojść do potencjalnie śmiertelnego zapalenia płuc i niezwykle rzadko do wielonarządowej infekcji (przez rozsiew krwiopochodny), objawiającej się zapaleniem opon mózgowych, zapaleniem kości i szpiku, z zajęciem skóry i tkanek miękkich.

Aktualizacja: kwiecień 2014

Tłumaczenie: październik 2015

This publication is part of the project / joint action '677024 / RD-ACTION' which has received funding from the European Union's Health Programme (2014-2020).



Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

