

:: Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń skórnych

Orpha number: 889

Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń skórnych to zapalenie małych naczyń krwionośnych, z plamicą i pokrzywką, które poprzedzają wystąpienie fioletowych zmian, najczęściej na nogach. Towarzyszą temu objawy ogólnoustrojowe, takie jak gorączka, kaszel, krwiotłucie, zapalenie zatok, bóle stawów, zapalenie stawów, bóle mięśni, bóle brzucha, biegunka, świeża krew w kale, parestezje, osłabienie i krwimocz. Biopsja skóry ujawnia wysięki bogate w neutrofile, uszkodzenia nabłonka, złogi włókniaka oraz leukocytoklazję w żyłkach pozawłosowatych małych naczyń krwionośnych. Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń skórnych może być idiopatyczne (do 50% przypadków) lub wtórne w przebiegu infekcji, kolagenozy naczyń, nowotworu lub w reakcji na leki (na przykład leki przeciwgruźlicze).

Aktualizacja: grudzień 2014

Tłumaczenie: wrzesień 2016

This publication is part of the project / joint action '677024 / RD-ACTION' which has received funding from the European Union's Health Programme (2014-2020).



Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

