

## Patientenorientierte Krankheitsbeschreibung aus dem ACHSE Netzwerk

Mitgliedsorganisation:	Haarzell-Leukämie-Hilfe e.V
Verfasser:	Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann Ambulantes Gesundheitszentrum der Charité Universitätsmedizin Berlin  Ao Univ. Prof. Dr. Michael Steurer Universitätsklinik für Innere Medizin V Hämatologie und Onkologie, Innsbruck/Österreich  Prof. Dr. Mathias Rummel Klinikum der Justus-Liebig-Universität, Gießen  Prof. Dr. Anthony D. Ho Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg
Bearbeitungsstand:	August 2010

---

### ***Haarzell-Leukämie***

#### **1 Was ist das?**

##### **1.1 Was ist eine Haarzell - Leukämie?**

Die Haarzell - Leukämie (HZL) ist eine bösartige Erkrankung der B Lymphozyten, einer Untergruppe der weißen Blutkörperchen. Unter dem Mikroskop zeigen die Leukämiezellen kleine Ausläufer, wie Haare. Daher stammt der Name dieser Leukämie. Die Krankheit verläuft bei den meisten Patienten langsam.

##### **1.1.1 Wie häufig ist eine Haarzell - Leukämie?**

Die Haarzell - Leukämie ist sehr selten. In jedem Jahr erkranken in Deutschland etwa 3 Personen auf 1.000.000 Einwohner. Das mittlere Alter der Patienten liegt zwischen 50 und 55 Jahren. Die Krankheit kann aber in jedem Alter auftreten, außer bei Kindern. Männer sind vier- bis fünfmal häufiger betroffen als Frauen.

##### **1.1.2 Wie entsteht eine Haarzell - Leukämie?**

Die Ursache der Haarzell - Leukämie ist nicht geklärt. Diskutiert wird ein Zusammenhang mit Insekten- und mit Unkrautvertilgungsmitteln. Bei der klassischen Haarzell-Leukämie ist eine Mutation im BRAF -Gen nachweisbar. Diese Mutation wird auch bei anderen bösartigen Tumoren gefunden.

## 1.2 Gibt es Methoden für Vorbeugung und Früherkennung?

Bisher gibt es keine wirksamen Maßnahmen zur Verhinderung einer Haarzell - Leukämie oder zur Früherkennung.

## 2 Krankheitszeichen

### 2.1 Welche Krankheitszeichen sind typisch?

Typisch für Patienten mit Haarzell - Leukämie ist die Kombination eines Mangels von Blutzellen und einer Vergrößerung der Milz. Bei den meisten Patienten steht der Mangel an Blutzellen im Vordergrund. Die Zellen des menschlichen Blutes werden in drei Gruppen eingeteilt: Erythrozyten (rote Blutkörperchen), Leukozyten (weiße Blutkörperchen) und Thrombozyten (Blutplättchen). Diese Blutzellen werden im Knochenmark hergestellt. Bei Patienten mit Haarzell - Leukämie entwickelt sich eine zunehmende Schwäche des Knochenmarks. Diese wird verursacht durch die Ausbreitung der Haarzellen im Knochenmark, dadurch werden die normalen Zellen verdrängt und unterdrückt. Typisch für die Haarzell- Leukämie ist auch die Bildung von Bindegewebe im Knochenmark (Fibrose), dadurch wird die Bildung von normalen Blutzellen zusätzlich behindert. Folgen dieser Schwäche des Knochenmarks sind in Tabelle 1 dargestellt.

*Tabelle 1: Häufige Krankheitszeichen bei Haarzell-Leukämie*

- allgemeine Müdigkeit, Schwäche und Blässe der Haut durch den Mangel an Erythrozyten, auch als Anämie bezeichnet
- Entzündungen durch den Mangel an Leukozyten
- Blutungsneigung mit Blutergüssen ohne erkennbare Ursache, Nachblutung bei kleinen Verletzungen, kleinen Blutpunkten vor allem an den Beinen und Füßen durch den Mangel an Thrombozyten

Etwa 70% der Haarzell - Leukämien haben einen Mangel in allen drei Zellreihen, es können aber auch nur eine oder zwei Gruppen der Blutzellen betroffen sein.

Weitere Krankheitszeichen sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

*Tabelle 2: Weitere, mögliche Krankheitszeichen bei Haarzell-Leukämie*

- Druckgefühl im linken Oberbauch (linke Flanke) und Seitenstiche bei Vergrößerung der Milz
- Druckgefühl im rechten Oberbauch (rechte Flanke) bei Vergrößerung der Leber
- vergrößerte, nicht schmerzhaft Lymphknoten
- Autoimmunkrankheiten
- Gewichtabnahme von mehr als 10 % des Körpergewichtes innerhalb von 6 Monaten
- Fieber > 38,3 °C ohne erkennbare Ursache
- nächtliches Schwitzen ohne erkennbare Ursache, typischerweise zwischen 2 und 5 Uhr morgens

Der Verlauf einer Haarzell - Leukämie ist unterschiedlich von Patient zu Patient. Die Krankheit verläuft langsam und wellenförmig. Das bedeutet, dass Krankheitszeichen mal stärker, mal schwächer ausgeprägt sind - auch ohne Behandlung.

### 3 Untersuchungen

#### 3.1 Wie wird eine Haarzell - Leukämie festgestellt?

##### 3.1.1 Welche Formen gibt es?

Neben der klassischen Haarzell - Leukämie gibt es eine seltenere Haarzell - Leukämie Variante. Die beiden Formen unterscheiden sich in den Krankheitszeichen, den Laborbefunden und in der Behandlung, siehe Tabelle 3. Während Patienten mit der klassischen Haarzell - Leukämie einen Mangel an Leukozyten im Blut haben, ist die Zahl der Leukozyten bei der Variante erhöht und kann bis zu 400.000 /  $\mu\text{l}$  ansteigen. Unterschieden werden die beiden Formen unter dem Mikroskop und vor allem in der Immunphänotypisierung.

Tabelle 3: Formen der Haarzell-Leukämie

	Klassische Haarzell - Leukämie	Haarzell - Leukämie Variante
Häufigkeit (%)	90 – 95	5 – 10
Geschlechtsverteilung	4 : 1 (M : W)	1 - 2 : 1 (M : W)
Alter (Mittelwert, Jahre)	50 – 55	> 70
Lymphozyten	erniedrigt oder normal	erhöht
Monozyten	erniedrigt	normal
Hämoglobin	erniedrigt	häufig normal
Thrombozyten	erniedrigt	häufig normal
Immunphänotyp 1	reifer B Lymphozyt, CD11c +, CD103 +, CD25 +	reifer B Lymphozyt, CD11c +, CD103 +, CD25 -

Legende: 1 nach CD Klassifikation - Cluster of Differentiation

Eine zweite Variante wurde in Japan beschrieben, ist aber nicht Bestandteil dieser Leitlinie.

##### 3.1.2 Welche Untersuchungen sind erforderlich?

Die Krankengeschichte und eine komplette körperliche Untersuchung sind Grundlage der weiteren Untersuchungen. Der Ablaufplan kann in Basis - und Spezialuntersuchung unterteilt werden, siehe Tabelle 4. Bei den meisten Patienten sind Haarzellen im Blut mit empfindlichen Methoden nachweisbar. Standard ist eine multiparametrische Immunphänotypisierung.

Tabelle 4: Untersuchungen bei Verdacht auf Haarzell-Leukämie

	Material / Methode	Untersuchung
<b>Basis</b>	Blut	großes Blutbild automatisiert und mikroskopisch
		LDH, Vitamin B12, Folsäure
<b>Spezial</b>	Ultraschall	Oberbauch
	Blut	Immunphänotypisierung
	Knochenmarkaspirat	mikroskopisch Immunphänotypisierung

	Knochenmarkbiopsie	mikroskopisch Immunhistochemie Faserfärbung
--	--------------------	---

### 3.1.3 Könnte es sich um eine andere Krankheit handeln?

Viele andere Krankheiten können zu einem Mangel an Blutzellen oder zu einer Vergrößerung der Milz führen. Die häufigeren Ursachen sind in Tabelle 5 zusammengefasst.

*Tabelle 5: Andere Ursachen für einen Mangel an Blutzellen und eine Vergrößerung der Milz*

Mangel an Blutzellen	Vergrößerung der Milz	Mangel an Blutzellen und Vergrößerung der Milz
Reaktive / toxische Knochenmarksveränderungen	Pfortaderthrombose unklarer Ursache	Splenisches Marginalzonen – Lymphom
Vitamin B12 – Mangel	Budd - Chiari – Syndrom	Folikuläres Lymphom
Folsäure – Mangel	Leberzirrhose mit Pfortaderhochdruck	Mantelzell – Lymphom
Myelodysplastisches Syndrom		Lymphozytisches Lymphom (B-CLL 1 )
Akute Leukämie		Prolymphozytenleukämie (PLL)
Non - Hodgkin Lymphom		Morbus Waldenström
Aplastische Anämie		Hämolytische Anämie
Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH)		Felty Syndrom
Osteomyelofibrose		

*Legende: 1 B-CLL - chronisch lymphatische Leukämie;*

## 4 Behandlung

### 4.1 Wie wird die klassische Haarzell - Leukämie behandelt?


Die klassische Haarzell - Leukämie ist eine gut behandelbare Erkrankung. Es stehen mehrere, wirksame Medikamente zur Verfügung. Die Behandlung soll erst beim Auftreten von Krankheitszeichen begonnen werden. Bei einigen Patienten wird eine Haarzell - Leukämie zufällig entdeckt, z. B. weil ein Blutbild aus einem anderen Grund gemacht wurde. Wenn die Patienten keine Beschwerden haben, ist eine Behandlung nicht erforderlich. Sie könnte in diesem Stadium mehr Schaden als Nutzen bewirken. Das Blutbild wird bei diesen Patienten regelmäßig, spätestens alle drei Monate, kontrolliert. Eine Behandlung sollte begonnen werden, wenn sich die Blutwerte verschlechtern. Grenzen sind in Tabelle 6 aufgeführt.

*Tabelle 6: Grenzwerte für einen kritischen Mangel an Blutzellen*

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• neutrophile Granulozyten &lt; 1000 / µl und / oder</li> <li>• Thrombozyten &lt; 100.000 / µl und / oder</li> <li>• Hämoglobin &lt; 11 g / dl</li> </ul> |
|--|

Ein Schema für die Entscheidungen über die Behandlung ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 6: Entscheidung über die Behandlung



Erstes Ziel der Behandlung ist es, wieder ein normales Blutbild zu erreichen. Wenn bei einem Patienten mit normalem Blutbild noch Reste der Haarzell - Leukämie im Knochenmark gefunden werden, spricht man von einer partiellen Remission, d. h. einer teilweisen Rückbildung. Wenn keine Haarzellen mehr gefunden werden und wenn sich eine vergrößerte Milz zurückgebildet hat, spricht man von einer kompletten Remission, d. h. einer vollständigen Rückbildung. Patienten mit einer kompletten Remission haben eine höhere Chance, dass die Krankheit in den ersten Jahren nach der Behandlung nicht wieder auftritt. Ein Rückfall kann sich aber bei Patienten mit partieller und bei Patienten mit kompletter Rückbildung ereignen. Die wirksamen Medikamente sind in Tabelle 7 zusammengefasst.

#### 4.1.1 Chemotherapie

Am wirksamsten bei der Haarzell - Leukämie sind Cladribin (2-Chlorodeoxyadenosin, 2-CdA) und Pentostatin (Dexoycoformicin). Es gibt leider keine Studie, in der diese beiden Medikamente direkt miteinander verglichen wurden. In Deutschland und Österreich hat sich Cladribin durchgesetzt.

#### **4.1.1.1 Cladribin (2-Chlorodeoxyadenosin, 2-CdA)**

95 - 98 % der Patienten mit einer klassischen Haarzell - Leukämie sprechen auf die Behandlung mit Cladribin an, davon erreichen über 75% der Patienten eine komplette Rückbildung. Cladribin kann auf verschiedene Weise gegeben werden, die Ergebnisse sind jeweils gleich gut:

1. subkutan täglich an 5 aufeinanderfolgenden Tagen
2. intravenös täglich an 5 bis 7 aufeinanderfolgenden Tagen
3. intravenös einmal pro Woche über 6 Wochen

Bei der subkutanen Behandlung wird Cladribin einmal am Tag unter die Haut gespritzt. Die intravenöse Behandlung kann entweder langsam als Dauertropf über einen ganzen Tag, d. h. über 24 Stunden, oder schneller, d. h. in 2 Stunden, durchgeführt werden. Patienten erhalten einen Behandlungszyklus. Bei der Haarzell - Leukämie erholen sich die Blutwerte langsam. Erst nach 4 Monaten wird entschieden, ob die Behandlung erfolgreich war. Nur wenn sich die Blutwerte dann nicht erholt haben, wird ein zweiter Behandlungszyklus durchgeführt. Etwa die Hälfte der Patienten erleidet innerhalb von 15 Jahren einen Rückfall. Dann ist eine erneute Behandlung mit demselben Medikament möglich, vor allem wenn sich der Rückfall spät ereignet, d. h. nach mehr als drei Jahren. Patienten, die zuerst eine Behandlung mit Interferon erhalten haben, können bei einem Rückfall mit Cladribin behandelt werden und sprechen ebenfalls sehr gut an.

#### **4.1.1.2 Pentostatin (Deoxycoformicin)**

Mehr als 90 % der Patienten mit einer klassischen Haarzell - Leukämie sprechen auf eine Behandlung mit Pentostatin an, mehr als 75 % erreichen eine komplette Rückbildung. Das Medikament wird intravenös in Abständen von zwei bis drei Wochen gegeben. Die Behandlung dauert mindestens drei Monate. In einer vergleichenden Studie war Pentostatin wirksamer als Interferon. Wenn nach der Behandlung mit Pentostatin ein Rückfall eintritt, ist eine erneute Behandlung mit demselben Medikament möglich. Bei Patienten, die auf Cladribin nicht ansprechen, kann die Behandlung auf Pentostatin umgestellt werden.

#### **4.1.1.3 Unterstützende Maßnahmen bei Chemotherapie**

Hauptnebenwirkung der Chemotherapie ist anfänglich ein weiterer Abfall der Blutzellen. Kritisch ist vor allem ein Abfall der Leukozyten mit dem erhöhten Risiko für Infektionen. Cladribin und Pentostatin werden über die Nieren und den Urin ausgeschieden. Deshalb muss die Nierenfunktion vor und während der Behandlung besonders sorgfältig überwacht werden. Bei einer eingeschränkten Nierenfunktion wird die Menge der Chemotherapie angepasst. Die Chemotherapie führt auch zu einer Unterdrückung des normalen Immunsystems. Dies kann an der Zahl von T-Helferzellen im Blut gemessen werden. Bei einem Abfall der T-Helferzellen unter 200 /  $\mu$ l besteht ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Lungenentzündung mit *Pneumocystis jirovecii*. Zur Vorbeugung sollten diese Patienten die Antibiotika Cotrimoxazol/Trimethoprim erhalten. Wenn besondere Risiken vorliegen, können zusätzlich andere Antibiotika erforderlich sein. Eine Anregung des Knochenmarks durch G-CSF ist bei Patienten mit Haarzell - Leukämie nicht routinemäßig sinnvoll, eine solche unterstützende Behandlung kann aber im Einzelfall erwogen werden.

## 4.1.2 Immuntherapie

### 4.1.2.1 Interferon

Interferon alpha war in den 80er Jahren die übliche und einzig verfügbare Behandlung. 75 - 80 % sprechen auf Interferon an, allerdings erreichen weniger als 20 % der Patienten eine komplette Remission. Interferon wird subkutan gespritzt, die Dosis liegt bei 2 bis 3 Millionen Einheiten pro Spritze. Das Medikament muss 3 - 5 mal pro Woche gespritzt werden. Interferon wirkt langsam, in den ersten zwei bis drei Monaten nach Beginn der Behandlung kann es sogar vorübergehend zu einer Verschlechterung der Blutwerte kommen. Mehr als 50 % der Interferon - Patienten erleiden innerhalb von 10 Jahren einen Rückfall. In einer vergleichenden Studie war Pentostatin wirksamer als Interferon. Interferon kann auch zuerst eingesetzt werden bei Patienten mit Haarzell - Leukämie, die einen starken Mangel an neutrophilen Granulozyten mit Blutwerten unter 500 / µl haben. Ziel einer solchen Vorbehandlung ist eine Anhebung der Blutzellen, dann folgt die Chemotherapie.








### 4.1.2.2 Rituximab

Rituximab ist ein monoklonaler Antikörper, zugelassen für die Behandlung von anderen indolenten Lymphomen. Voraussetzung für die Wirksamkeit von Rituximab ist der Nachweis der CD20 Struktur. Haarzellen haben CD20 auf ihrer Oberfläche und sind empfindlich für Rituximab. 50 bis 80 % der Patienten mit Haarzell - Leukämie sprechen auf eine Behandlung mit Rituximab an, eine komplette Remission wird bei 20 bis 50 % erreicht. Diese Erfolge sind jedoch zumeist nicht lang anhaltend. Rituximab wird intravenös alle 4 Wochen über 2 - 4 Zyklen gegeben. In Studien wird Rituximab mit Chemotherapie kombiniert.

### 4.1.3 Gibt es andere Medikamente?

Andere Chemotherapie - Medikamente sind bei der klassischen Haarzell – Leukämie wenig wirksam. Eine viel versprechende Weiterentwicklung der Immuntherapie ist die Kombination mit Toxinen, das sind Giftstoffe aus Bakterien oder Pflanzen.

Tabelle 7: Medikamente und Zulassungsstatus

Substanz	Zulassung	Anmerkungen
Cladribin (Leustatin®)		Haarzell – Leukämie intravenös als Dauertropf über 7 Tage
Cladribin (Litak®)		Haarzell – Leukämie subkutan über 5 Tage
Interferon alpha2a (Roferon®)		Haarzell – Leukämie
Interferon alpha2a, pegyliert (Pegasys®)		
Interferon alpha2b (IntronA®)		Haarzell – Leukämie
Interferon alpha2b, pegyliert (PegIntron®)		
Pentostatin (Nipent®)		Haarzell – Leukämie
Rituximab (Mabthera®)		In Studien wirksam

#### **4.1.4 Wann ist eine Operation der Milz sinnvoll?**

Die Entfernung der Milz war die erste wirksame Behandlung von Patienten mit Haarzell - Leukämie. Kurzfristig verbessern sich die Blutwerte dadurch bei bis zu 70 % der Patienten. Allerdings erleiden über 90 % einen Rückfall. Bei Patienten mit klassischer Haarzell - Leukämie ist die Operation der Milz keine Standardbehandlung. Sie kann aber in Erwägung gezogen werden bei Patienten, die nicht auf Chemotherapie oder Interferon ansprechen und bei denen eine große Milz Beschwerden macht.

#### **4.2 Wie wird die Haarzell - Leukämie Variante behandelt?**

Die Haarzell - Leukämie Variante verläuft aggressiver als die klassische Haarzell - Leukämie. Patienten mit der Variante sprechen schlechter auf Chemotherapie mit Cladribin oder Pentostatin an. Nur bei etwa 50 % normalisieren sich die Blutwerte durch die Behandlung. Auch Interferon oder andere Medikamente der Chemotherapie sind wenig wirksam. Bei Patienten mit der Haarzell - Leukämie Variante ist eine Operation der Milz eine Behandlungsmöglichkeit, wenn sie nicht auf Chemotherapie ansprechen oder einen frühen Rückfall erleiden.

### **5 Nachsorge / Kontrollen**

© klinik sonneneck wyk auf föhr

#### **5.1 Welche Kontrollen sind sinnvoll? In welchen Abständen? Wie lange?**

Die Haarzell - Leukämie ist eine chronische Erkrankung. Rückfälle können auch nach vielen Jahren passieren. Ein festgelegtes Schema für Nachuntersuchungen gibt es nicht. Die Kontrollen sollen sich am einzelnen Patienten und seinem Rückfallrisiko orientieren: In den ersten 6 Monaten nach Erreichen einer Remission sind Kontrollen des Blutbildes in vierwöchentlichen Abständen sinnvoll, eine Ultraschalluntersuchung zur Kontrolle der Milzgröße alle 3 Monate. Wenn die Blutwerte stabil sind, können die Abstände der Blutbildkontrollen auf 3 Monate und für die Ultraschalluntersuchung auf 6 Monate verlängert werden.

#### **5.2 Wie sind die Chancen? Wie ist die Lebenserwartung?**

Etwa 70% der Patienten mit Haarzell - Leukämie haben eine normale Lebenserwartung. Entscheidend ist das Ansprechen auf die Behandlung. Je besser Patienten auf die Behandlung ansprechen, umso besser die Prognose. In einigen Langzeitstudien wurden vermehrt Fälle von anderen Krebserkrankungen bei Patienten mit Haarzell - Leukämie beobachtet. Da die Ergebnisse nicht einheitlich sind, gibt es bisher keine Empfehlung für ein besonders Vorsorgeprogramm bei Patienten mit Haarzell - Leukämie.

### **6 Welche weitere Unterstützung braucht der Patient?**

Eine Diagnose mit dem Wort „Leukämie“ ist ein Schock, auch wenn man eine Haarzell-Leukämie als „Glück im Unglück“ bezeichnen könnte. Die Mehrzahl der betroffenen Patienten steht im Berufsleben, hat eine Lebenserwartung von Jahrzehnten vor sich und muss es schaffen, diese Krankheit in Ihr Leben zu integrieren. Wichtige Bausteine sind ein intaktes Umfeld und zuverlässige, seriöse Informationen. Wir ermutigen alle Patienten, sich



bei Unsicherheit eine Zweitmeinung in einem Zentrum einzuholen. Das ist kein Vertrauensbruch gegenüber den behandelnden Ärzten, sondern steht jedem Patienten zu.

Zu dieser Unterstützung gehört auch die Psychoonkologie. Professionelle Gespräche erleichtern die Verarbeitung des Diagnoseschocks und setzen Kräfte zum aktiven Umgang mit der Krankheit frei.

Eine weitere Herausforderung sind die sozialen und finanziellen Belastungen einer Haarzell-Leukämie. Patienten steht ein Schwerbehindertenausweis zu. Entlastungen und Umstrukturierungen am Arbeitsplatz, Härtefallregelungen, steuerliche Erleichterungen u.a. können wirksam helfen.

Sollten Ihnen die psychoonkologischen und sozialmedizinischen Angebote nicht aktiv gemacht werden, fragen Sie bei den betreuenden Ärzten, Praxen oder Krankenhäusern nach.

## **7 Was muss ich als Haarzell-Leukämiepatient beachten?**

Die meisten Komplikationen entstehen durch Infektionen. Patienten mit normalem Blutbild und mehr als 6 Monaten Zeitabstand zur letzten Behandlung haben keine deutlich erhöhte Infektionsrate. Dennoch bleiben sie Risikopatienten. Empfohlen wird die Teilnahme an der jährlichen Gripeschutzimpfung. Auch andere Impfungen wie Tetanus u. a. sollten regelmäßig durchgeführt bzw. aufgefrischt werden.

## **8 Welche Ärzte sind für die Haarzell-Leukämie zuständig?**

Zuständig sind die Ärzte für Hämatologie und Onkologie. Die Betreuung erfolgt in Praxen oder in spezialisierten Krankenhausambulanzen. Einen besonderen Schwerpunkt für Haarzell-Leukämien haben die Universitätskliniken in:

Berlin, Charité Universitätsmedizin Campus Virchow, Haarzell-Leukämiesprechstunde,  
Ansprechpartner: Prof. Dr. B. Wörmann

Gießen, Universitätsklinik, Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Rummel

Heidelberg, Universitätsklinik, NCT Nationales Krebszentrum, Ansprechpartner: Prof. Dr. A. Ho.

## **9 Weitere Infos**

### **9.1. Haarzell-Leukämie-Hilfe e.V.**

Die Haarzell-Leukämie-Hilfe e.V. ist die einzige Selbsthilfe-Initiative für Haarzell-Leukämie-Patienten und ihre Angehörigen in der Bundesrepublik. Wir bekommen Unterstützung von Ärzten, die sich mit der Erkrankung sehr gut auskennen und geben unsere Erfahrungen im Umgang mit den Therapien weiter.

<http://www.haarzell-leukaemie.de>

### **9.2. Deutsche Leukämie- & Lyphom-Hilfe e.V. (DHL)**

Die Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe e.V. (DLH) ist der Bundesverband der Selbsthilfeorganisationen zur Unterstützung von Erwachsenen mit Leukämien und Lymphomen. Die Geschäftsstelle befindet sich in Bonn. Ein Arbeits-schwerpunkt liegt bei der Förderung lokaler und regionaler Selbsthilfeinitiativen für Leukämie- und Lymphombetroffene.

[www.leukaemie-hilfe.de](http://www.leukaemie-hilfe.de)

## **10 Wer behandelt?**

### **10.1 Onkologische Zentren**

Liste zertifizierter Onkologischer Zentren :

<http://www.dgho.de/zertifizierungen/onkologische-zentren/liste-der-oz>

### **10.2 DGHO Mitgliederdatenbank**

DGHO Ärzteverzeichnis:

<http://www.dgho.de/aerzte/>

## **11 Quellenangabe**

[www.dgho-onkopedia.de](http://www.dgho-onkopedia.de)

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

## **12 Anschriften der Verfasser**

**Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann**

Ambulantes Gesundheitszentrum der Charité Universitätsmedizin Berlin

Campus Virchow Klinikum

Medizinische Klinik m. S. Hämatologie und Onkologie

Augustenburger Platz 1  
13344 Berlin  
Tel.: 030 / 450553219  
bernhard.woermann@charite.de  
Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie  
Berolinahaus  
Alexanderplatz 1  
10178 Berlin (Mitte)  
Tel.: 030 / 27 87 60 69 - 0  
woermann@dgho.de

**Ao Univ. Prof. Dr. Michael Steurer**  
Universitätsklinik für Innere Medizin V  
Hämatologie und Onkologie  
Anichstr. 35  
A-6020 Innsbruck/Austria  
Tel.: 0043 / 512 / 504-81386  
Fax: 0043 / 512 / 504-25615  
Michael.Steurer@i-med.ac.at

**Prof. Dr. Mathias Rummel**  
Klinikum der Justus-Liebig-Universität  
Medizinische Klinik IV  
StiL-Studienzentrale  
Klinikstr. 36  
35392 Gießen  
Tel.: 0641 / 99-42600  
Fax: 0641 / 99-42609  
Mathias.Rummel@innere.med.uni-giessen.de

**Prof. Dr. Anthony D. Ho**  
Universitätsklinikum Heidelberg  
Medizinische Klinik V  
Im Neuenheimer Feld 410  
69120 Heidelberg  
Tel.: 06221 / 56-8001  
Fax: 06221 / 56-5813  
anthony\_ho@med.uni-heidelberg.de