

## Болезнь Микулича

Номер статьи: ORPHA 79078

### Резюме

Болезнь Микулича относится к склеродирующим заболеваниям, связанным с IgG4 (см. этот термин), и характеризуется постоянным, как правило безболезненным, двусторонним увеличением слезных, околоушных и подчелюстных желез, что коррелирует с повышением уровня сывороточного иммуноглобулина (Ig) G4, а также с инфильтрацией лимфоцитов и IgG4-положительных плазматиков. Это заболевание, в основном, приводит к сухости рта и глаз, а также может поражать другие органы, например легкие, печень и почки, и сопровождаться осложнениями, такими как аутоиммунный панкреатит (АИП), фиброзный периуретерит и тубулоинтерстициальный нефрит (см. эти термины).

Последнее обновление: 01 2013

Переведено: ООО «БП ИНВАРИАНТ» и МРБООИ СПИПОРЗ

Рецензент документа перевода:

- Семенова Н.А.

Переведено: 12 2014

*Данная статья была переведена при финансовой поддержке Янссен, фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон» и Межрегиональной благотворительной общественной организации инвалидов «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям»*



Настоящий документ представлен исключительно в информационных целях. Материал никоим образом не предназначен для замены профессиональной медицинской помощи квалифицированными специалистами и не должен быть использован в качестве основы для диагностики или лечения.



Дополнительную информацию о заболевании вы можете найти на [www.orpha.net](http://www.orpha.net) 1