

## :: Guillain-Barrého syndróm

Orpha číslo: ORPHA2103

### Prehľad

Guillain-Barré syndróm (GBS) je termín používaný pri opise spektra vzácnych post infekčných neuropatií, ktoré sa zvyčajne objavujú na inak zdravom jedincovi.

GBS je klinicky heterogénna jednotka a zahŕňa akútnu inflamačnú demyelinizačnú polyradikuloneuropatiu (AIDP), akútnu motorickú axonálnu neuropatiu (AMAN) a akútnu motoricko- senzorickú axonálnu neuropatiu (AMSAN), Miller Fisherov syndróm (MFS, vid' tam) a a niektoré iné regionálne varianty. Celková ročná incidencia GBS varíruje od 1:91 000 do 1:55 000. V Európe a v Severnej Amerike, AIDP je najčastejšia forma GBS (celkovo asi 90% prípadov) , z čoho vyplýva, že v západných krajinách je termín GBS synonymom s termínom AIDP. V západných krajinách axonálna forma predstavuje zhruba 3-5% prípadov, ale je oveľa častejšou formou (30-50% prípadov GBS) v Ázii a v Latinskej Amerike. Vo väčšine prípadov infekčné ochorenie spôsobené *Campylobacter* jejuni predchádza vzniku slabosti končatín. V literatúre sa rovnako uvádza aj vznik GBS po predchádzajúcej vakcinácii alebo chirurgickom zákroku. Liečba pozostáva zo včasného podania intravenózných imunoglobulínov (IVIg) alebo plazmaferézy. Fyzioterapia a rehabilitácia sú nemenej dôležité. Prognóza je variabilná a závisí od formy GBS a varíruje od prípadov s úplným zotavením sa až po pacientov neschopných chôdže aj 6 mesiacov po vzniku ochorenia, či dokonca prípady s fatálnym koncom.

Odborný recenzent :

- Pr P.A. [Pieter] VAN DOORN

Posledná úprava : December 2009

Preklad : December 2012, MUDr. Katarína Hlavatá



---

Tento dokument slúži len pre informačné účely. Jeho cieľom nie je nahradiť lekársku starostlivosť kvalifikovanými odborníkmi a údaje v ňom uverejnené by nemali byť východiskom diagnostiky a liečby.

---



Find more information on the disease and associated services on [www.orpha.net](http://www.orpha.net)